

BIOCIPER EW 25

Ingrediente activo:	Cipermetrina
Formulación:	Es una emulsión en agua a base del ingrediente activo cipermetrina a una concentración del 25% (250g ingrediente activo/L de producto comercial)
Grupo Químico:	Piretroide
Clase Fitosanitaria:	Insecticida
Toxicidad:	Oral aguda DL50 (rata): Aceite 250 mg/kg Suspension acuosa 4123 mg/kg
Modo de acción:	Es un insecticida que actua por contacto e ingestión, produce un bloqueo de la conducción de estímulos nerviosos y afecta los canales de sodio y potasio
Plagas:	Para uso doméstico en el control de mosquitos, moscas, cucarachas, jejenes, piojos, chinches y otros vectores de enfermedades
Dosis:	40 mL/5 L de agua para 100 metros cuadrados (infestaciones severas), 20 mL/5 L para 100 metros cuadrados en aspersión, 400 mL/5 L de agua para 5000 metros cúbicos aplicado en nebulización UBV
Tiempo para reingreso:	2 horas
Primeros auxilios:	INGESTION: NUNCA PROVOQUE EL VOMITO, POR EL PELIGRO DE UNA ASPIRACION PULMONAR. Obtenga atención médica inmediatamente. INHALACION: Retire a la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. Obtenga atención médica inmediatamente. CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica. CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.
Medidas de protección al ambiente:	NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS
Transporte y	No transporte este producto con alimentos, semillas,

Almacenamiento: forrajes, medicamentos herbicidas, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de llamas, de los niños, los animales domésticos y personas discapacitadas. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

Manejo de desechos: Aproveche el contenido completo de envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección de envase, entregue estos al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de desame aplique aserrín u otro material absorbente, recolecte este material en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.