

PLAGOX GEL 2.15 GEL

CARACTERISTICAS QUIMICAS:

Tipo: insecticida

Ingrediente Activo: Imidacloprid

Grupo Química: Cloronicotinilo

Formulacion: Gel- Listo para usar

Concentracion: 2.15

Modo de Acción: Contacto e ingestión

Categoría Toxicológica: Categoría IV

Presentacion: Jeringa de 30 Grs.

BENEFICOS Y VENTAJAS

- Rápida reducción de la población de cucarachas
- Excelente adherencia a superficies
- Aplicación fácil y segura
- Contiene amargante para prevenir la ingestión humana
- Efecto dominó (por cada cucaracha que ingiere imigel 2.15 se elimina entre 40-50)
- Baja toxicidad para mamíferos

RECOMEDACIONES DE USO

Imigel 2.15 Gel para el uso urbano e industrial en el control de cucarachas actúa por ingestión y por contacto en el sistema nervioso de los insectos afectando al receptor nicotínico de la acetilcolina causando el bloqueo completo de los impulsos nerviosos.

PLAGAS	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS
Cucaracha Americana	Periplaneta americana	<p>De 1 a 5 gotas por metro cuadrado o lineal.</p> <p>El volumen de aplicación depende de grado de infestación</p> <p>La aplicación de un número mayor de gotas pueden dar un resultando más rápido</p> <p>Repetir la aplicación hasta que no se observen cucarachas</p>
Cucaracha Alemana	Blattella germanica	
Cucaracha oriental	Blatta orientalis	
Curacacha Bada Café	Supella longipalpa	

METODO DE APLICACIÓN:

Imigel 2.15 para el control de cucarachas viene en jeringas plásticas lista para su uso.

- Limpie el área antes de aplicar
- Remover el tapón que cubre la boquilla de la jeringa y aplicar el gel directamente presionando suavemente el émbolo.
- Se recomienda su aplicación en los siguientes sitios:
 - Grieta y/o lugares de refugios de las cucarachas, en cocinas, mesas y cajones, etc.
 - Esquinas o debajo de mesas donde se preparan alimentos
 - Debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, congeladores, motores y computadoras, etc.
- No aplicar el gel en los siguientes sitios:
 - Areas que se laven en forma rutinaria o áreas recién tratadas con insecticida de contacto
 - No aplicar ningún otro producto sobre el gel porque puede causar efectos repelentes sobre el mismo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

Conservar y transportar el Imigel 2.15 en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz sol. Maneje con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

MANEJO DE ENVASES, PAQUETES, DESECHOS Y REMANENTES:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y normas locales vigentes. EL USO DE ENVASES O PAQUETES DE FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELE A LA MEZCLA YA PREPARADA.

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES:

- Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas y animales domésticos.
- Nocivo si es ingerido
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- No arrojar residuos a los ríos. Producto tóxico para crustáceos y peces.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

SINTOMAS DE INTOXICACION: Apatía, debilidad muscular, malestar general, dolor de cabeza, vómitos y sudoración.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: No provoque el vomito, suministre 4 cucharas de carbón activado en medio vaso de agua o clara de huevo (8 en adultos y 4 en niños). Busque atención médica.

INHALACION: Leve el paciente a un lugar fresco y ventilado. Si es necesario dele respiración artificial.

CONTACTO CON LA PIEL: Retire la ropa contaminada y lave las partes afectas con abundante agua y jabón.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con un chorro suave de agua durante por lo menos 15 minutos.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: Imigel no tiene antídoto ,aplique tratamiento sintomático y de soporte